

V primeru, da so površine na katerih ste ali boste izvedli setev ozimnih žit, zapleveljene z agresivnimi pleveli, lahko **za varstvo posevkov po setvi, vendar pred vznikom žit oziroma po vzniku** po potrebi uporabite enega od pripravkov ko so:

Pripravek aktivna snov	za zatiranje uporaba v	odmerek	tretiramo	karenca
BOXER prosulfokarb 80%	ozkolistnih in širokolistnih plevelov <i>ozimni ječmen ozimna pšenica ozimna rž</i>	5 l/ha 2,5-5 l/ha (nižji odmerek v primeru kombinacije sredstva z drugimi sredstvi) Poraba vode: 300-400 l/ha	pred vznikom žita (le če je zagotovljena dobra pokritost semena oz. globina setve vsaj 2-3 cm!) po vzniku, ko imajo ŽITA najmanj 1 in največ 2 lista	zagotovljena s časom uporabe
COUGAR diflufenikan 10% + izoproturon 50%	enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov <i>ozimni ječmen ozimna pšenica (izjema durum sorte)</i>	1,25 – 1,75 l/ha Poraba vode: 200-400 l/ha Ne priporočamo za uporabo na izrazito lahkih tleh, tleh z več kot 10 % humusa, ob pozni setvi ali neugodnih razmerah.	po setvi, pred vznikom ko žito razvije tri liste	zagotovljena s časom uporabe
HERBAFLEX beflubitamid 8,5 % + izoproturon 50 %	enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov ječmen ozimna pšenica rž tritikala	2 l/ha Poraba vode: 200-400 l/ha	jeseni po vzniku, ko so razviti 2 do 3 listi LAHKO tudi spomladi od začetka rastne dobe od razvojne faze 3 lista do konca razraščanja	zagotovljena s časom uporabe
LOGRAN 20 WG triasulfuron 20 %	širokolistnih plevelov jari in ozimni ječmen jara in ozimna pšenica rž tritikala oves	35-40 g/ha Poraba vode: 100-400 l/ha	do konca razraščanja žit	zagotovljena s časom uporabe, pri uporabi žit za zeleno krmo je karenca 14 dni
MEZZO metsulfuron-metil 20 %	enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov ječmen jara in ozimna pšenica tritikala oves	20-30 g/ha Poraba vode: 200 l/ha	po vzniku, ko imajo pšenica, oves ali tritikala vsaj 2 lista oziroma ječmen vsaj 3 liste pa do fenološke faze zastavičarja	zagotovljena s časom uporabe
STOMP 400 SC pendimetalin 40 %	enoletnih ozkolistnih in nekaterih vrst širokolistnih plevelov <i>ozimni ječmen ozimna pšenica ozimna rž tritikala</i>	2,5 – 5 l/ha Poraba vode: 200-400 l/ha	po setvi ali v fazi 2-3 listov pšenice Sredstvo v posevkih uporabimo le JESENI! <i>Uporaba v žitih za klajo oz. zeleno krmo ni dovoljena!</i>	90 dni

Opomba: Pripravki TOLUREX 50 SC, TOLUREX 80 WP in ACTIVUS 40 WG, ki so registrirani za uporabo v žitih tudi v Sloveniji in bi jih lahko v žitih tudi uporabili v jesenskem času se pri nas trenutno ne tržijo.

Pripravila: Iris Škerbot, univ.dipl.inž.agr.
svetovalec specialist II (za področje varstva rastlin)