

## HERBICIDI za ZATIRANJE ŠČAVJA in NEZAŽELJENIH ZELI NA TRAVNIKIH in PAŠNIKIH

Pripravek aktivna snov	odmerek	uporaba	opombe
<b>BANVEL 480 S</b> dikamba sol 48%  <b>Karenca:</b> trava za košnjo 14 dni, delovna karenca za dostop rejnih živali na pašnikih 14 dni.	<b>0,25-0,5%</b>	- tretiramo posamezna gnezda plevela, ko je plevel v polni vegetaciji.	Delovna karenca za ljudi je 1 dan ali ko se tretirana površina posuši.  Sredstva ne uporabljamo pri temperaturah višjih od 28°C.
<b>BASAGRAN 480</b> bentazon 48%  <b>Karenca:</b> za lucerno, deteljo, travo za pridelavo semena in pašnike je zagotovljena s časom uporabe	<b>1,5-2 l/ha</b>	- lucerno in deteljo tretiramo po tretjem razvitem listu posevka, - semenske trave tretiramo v času, ko ima trava 3 – 5 listov, - pašnike tretiramo, ko ima trava 3 – 5 listov in detelje več kot 3 liste.	S sredstvom na istem zemljišču tretiramo največ 1-krat letno pri temperaturah od 10 do 25°C. Po tretiranju naj vsaj nekaj ur ne dežuje.  Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha.
<b>DUPLOSAN KV</b> mekoprop – P 60 %  <b>Karenca:</b> travniki in pašniki 28 dni	<b>3,0 l/ha</b>	- tretiramo v času, ko so rastline visoke 20-30 cm	Deloma škodljivo deluje na detelje. Manj zadovoljivo deluje na alpsko kislico ( <i>Rumex alpinus</i> ). Priporočilo: uporaba v zmerno toplem vremenu (temperature med 10 in 25°C). <u>Sredstvo se lahko uporablja le ob uporabi traktorske škropilnice!</u> Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.
<b>ESTERON</b> 2,4-D 2-EHE 90,5% <b>Karenca:</b> za travnike in pašnike je 28 dni	<b>1 l/ha</b>	- na pašnikih in travnikih spomladi v fenološki fazi od razvrščanja do stopnje zastavičarja (BBCH 21-39)	Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.  Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha.

<b>GRODYL</b> amidosulfuron 75%  <b>Karenca:</b> 7 dni za travo za pašo in svežo krmo, 21 dni za seno	<b>1,0 g/10 l vode</b>  <b>40-60 g/ha</b>	Prednost pred tretiranjem celotne površine ima tretiranje posameznih rastlin!  - posamezne rastline oz. gnezda nekaterega širokolistnega plevela;  - po prvem ali tretjem odkosu (rastline visoke 10-15 cm),	Za zatiranje: topolistne in kodrolistne kislice, navadnega regrata, zlatih, travniške penuše, navadnega rmana, koprive, navadne lakote in navadnega dežena. Sredstvo je selektivno za plazečo deteljo in delno za lucerno. Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha.
<b>HARMONY 75 WG</b> tifensulfuron - metil 75%  <b>Karenca:</b> travniki in pašniki 21 dni	<b>20-30 g/ha + močilo</b>  <b>0,6 g/10 l vode + močilo</b>	- tretiramo rastline v fazi bujne rasti v stadiju rozete (višina 15 cm oz- 4 liste)  - tretiramo lahko tudi posamične rastline oz. gnezda nekaterih vrst širokolistnega plevela (preko celega leta).	<u>Cele površine tretiramo jeseni ali pozno poleti.</u>  Selektiven na metuljnice-detelje.  Ne uporabljati pri T višjih od 25°C in nižjih 6°C!  Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.
<b>HERBOCID</b> 2,4-D DMA 55,9 %  <b>Karenca:</b> travniki in pašniki 28 dni	<b>2,2 l/ha</b>	- tretiramo v času, ko so trave v polnem razraščanju oz. po prvem odkosu, ko se začnejo ponovno razraščati.	Tretiramo pri temperaturah med 5 in 25°C!  Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.  Priporočena poraba vode do 400 l/ha.
<b>STARANE 2</b> ali <b>TOMIGAN 200 EC</b> fluroksipir 1 MHE 28,8 %  <b>Karenca:</b> travniki in za dostop rejnih živali na pašnike 21 dni	<b>1,2-1,8 l/ha</b>	- tretiramo v času intenzivne rasti plevelov.	Sredstva se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu ter na kraških območjih in tleh z vsebnostjo organske snovi pod 2%.  Priporočena poraba vode: 300-400 l/ha.  Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.
<b>U 46 M-FLUID</b> MCPA DMA 94,3%	<b>1,5-2,0 l/ha</b>	- travniki in pašniki, pridelava travnega semena.	Priporočena se tretiranje pri temperaturah zraka pod 25°C, v času brez vetra, v večernih urah.  Priporočena poraba vode: 200-600 l/ha.  Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni