



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
CELJE

Oddelek za kmetijsko svetovanje
Mestni trg 7, 3310 Žalec

tel. 03 710 17 88

E pošta: iris.skerbot@ce.kgzs.si

Žalec, 19.04.2011

ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV na ŽITIH (žitni strgač, listne uši)

PRAGOVI GOSPODARSKE ŠKODE:

Škodljiv organizem	prag gospodarske škode
Rdeči žitni strgač (<i>Oulema melanopus</i>)	- povprečno 1 ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m ² ali - 15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov
Listne uši: velika žitna uš (<i>Sitobion avenae</i>) zelena listna uš (<i>Schizapis graminum</i>) svetla žitna uš (<i>Metopolophium dirhodum</i>) čremsina uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>)	- v času cvetenja: več kot 5 do 8 uši na klasu ali z ušmi naseljeno več kot 20 % klasov - v sredini mlečne zrelosti: 7 do 10 uši na klasu ali z ušmi naseljeno več kot 30 % klasov

Pripravek aktivna snov	Odmerek	Škodljivec		Opombe
		Rdeči žitni strgač	Listne uši	
karenca				
ZA ZATIRANJE ŽITNEGA STRGAČA IN LISTNIH UŠI				
BISCAYA tiaklopid 24 % karenca: zagotovljena s časom uporabe	0,3 l/ha	✓	✓	- uporaba v ječmenu, ovsu, rži, tritikali in pšenici
BULLDOCK EC 25 beta-ciflutrin 2,5 % karenca: 21 dni	0,3-0,5 l/ha	✓	✓	- uporaba v pšenici, ječmenu, ovsu, tritikali in rži
DECIS 2,5 EC deltametrin 2,5 % karenca: 30 dni	0,2-0,3 l/ha	✓	✓	- uporaba v strnih žitih
KARATE ZEON 5 CS lambda-cihalotrin 5 % karenca: 30 dni	0,15 l/ha	✓	✓	- uporaba v pšenici, ječmenu, ovsu, tritikali in rži
MAVRIK 240 tau-fluvalinat 24 % karenca: 28 dni v pšenici, rži in tritikali; 49 dni v ječmenu in ovsu	0,2 l/ha	✓	✓	- uporaba v pšenici, ječmenu, ovsu, rži in tritikali
POLECI deltametrin 2,5 % karenca: 30 dni	0,2-0,3 l/ha	✓	✓	- uporaba v strnih žitih
ZA ZATIRANJE LISTNIH UŠI				
FASTAC 100 EC alfa-cipermetrin 10 % karenca: 21 dni	0,125 l/ha		✓	- uporaba v ječmenu in pšenici
PRIMOR 50 WG pirimikarb 50 % karenca: 35 dni	0,04-0,06 % konc.		✓	- uporaba v pšenici, ječmenu, ovsu, tritikali in rži
TEPPEKI flonikamid 50 % karenca: 28 dni	0,14 kg/ha		✓	- uporaba v pšenici, tritikali in rži

V primeru, da želi pridelovalec, vključen v integrirano pridelavo poljščin, piretroide uporabiti dvakrat letno, mora za to pridobiti soglasje kontrolne organizacije, ki preveri upravičenost dvakratne rabe.

**Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva OBVEZNO preberite in UPOŠTEVAJTE navedbe na etiketi in NAVODILO O UPORABI, ki je priloženo sredstvu!
Ne pozabite na varstvo čebel in varovanje voda!**

Pripravila: Iris Škerbot, univ.dipl.inž.agr.
svetovalec specialist II (za varstvo rastlin)