



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
CELJEOddelek za kmetijsko svetovanje
Mestni trg 7, 3310 Žalec E pošta:tel. 03 710 17 88 fax 03 710 17 81
iris.skerbot@ce.kgz.s.si

Žalec, 10.06.2011

INSEKTICIDI REGISTRIRANI za ZATIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA na KROMPIRJU

Preparat	odmerek	karenca	opombe
ACTARA 25 WG tiametoksam 25 %	60-80 g/ha poraba vode: 300-600l/ha	14 dni	- tretiramo ob pojavu škodljivcev, - tretiramo ko ni vetra.
ALVERDE metaflumizon 24 %	0,25 l/ha	14 dni	- sredstvo je najbolj učinkovito na mlade ličinke takoj po izleganju iz jajčec.
BISCAYA tiaklopid 24 %	0,3 l/ha poraba vode: 200-500l/ha	14 dni	
BULLDOCK EC 25 beta-ciflutrin 2,5 %	0,5 l/ha	7 dni	- priporoča se uporaba antidriftnih šob.
CALYPSO SC 480 tiaklopid 48 %	0,1 l/ha ali v deljeni aplikaciji 0,05 + 0,05 l/ha poraba vode: 500-800l/ha	21 dni	
CORAGEN klorantraniliprol 20 %	0,06 l/ha poraba vode: 300-600l/ha	14 dni	- tretiranje se odsvetuje v primeru bližajočih se padavin. Izogibajte se tretiranju med cvetenjem.
LASER 240 SC spinosad (spinosin A + spinosin D) 24 %	0,2 l/ha <i>priporočljivo je dodajanje močila</i>	7 dni	- tretiramo prve ličinke ali takoj po izleganju jajčec.
MATCH 050 EC lufenuron 5%	0,3 l/ha	ČU	
MAVRIK 240 tau-fluvalinat 24 %	0,2 l/ha poraba vode: 200-400l/ha	14 dni	- za zatiranje ličink in zmanjševanje številčnosti populacije odraslih hroščev, - uporaba je dovoljena samo s traktorskimi škropilnicami.
MOSPILAN 20 SG acetamiprid 20 %	0,1 kg/ha poraba vode: 400l/ha	14 dni	
NEEMAZAL T/S azadirachtin 1%	0,25 % (25 ml / 10 l vode)	ni potrebna	- tretiramo približno 5 dni po tem, ko smo našli v povprečju več kot 10 skupkov jajčec na 50 rastlin
RAPTOL KONCENTRAT olje navadne ogrščice 82,53 % + piretrin 1,834 %	10 l/ha	3 dni	- s sredstvom se tretira ob pojavu škodljivcev tako, da se rastline dobro omoči, - priporoča se tretiranje zvečer ali v hladnejšem delu dneva.
RAPTOL SPRAY olje navadne ogrščice 0,825 % + piretrin 0,018 %	100 %	3 dni	
BIOTIP FLORAL piretrin 1,816 %	0,16 % (16 ml / 10 l vode / 100 m ²)	3 dni	- s sredstvom se tretira ob pojavu škodljivcev tako, da se rastline dobro omoči (tudi spodnja stran listov), - za zatiranje jajčec, ličink in odraslih oblik koloradskega hrošča,
FLORA VERDE piretrin 1,816 %	0,16 % (16 ml / 10 l vode / 100 m ²)	3 dni	
SPRUZIT PRAH piretrin 0,3 %	2,5 g / m ²	1 dan	- priporoča se tretiranje zvečer ali v hladnejšem delu dneva.

Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva **OBVEZNO** preberite in **UPOŠTEVAJTE** navedbe na etiketi
in **NAVODILO O UPORABI**, ki je priloženo sredstvu!

Dosledno upoštevajte opozorila glede varstva čebel, varstva voda,...

Pripravila: Iris Škerbot, univ.dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II (za varstvo rastlin)