

## REGISTRIRANI HERBICIDI za ZATIRANJE ŠČAVJA in NEŽELENIH ZELI NA TRAVNIKIH in PAŠNIKIH

Preparat aktivna snov	odmerek	uporaba	opombe
<b>BANVEL 480 S</b> dikamba sol 48%  <b>Karenca:</b> trava za košnjo 14 dni, delovna karenca za dostop rejnih živali na pašnik je 14 dni.	<b>0,25-0,5%</b>	- tretiramo samo posamezna gnezda večletnega plevela, ko je plevel v polni vegetaciji.	Delovna karenca za ljudi je 1 dan ali ko se tretirana površina posuši.  Sredstva ne uporabljamo pri temperaturah višjih od 28°C.
<b>BASAGRAN 480</b> bentazon 48%  <b>Karenca:</b> za lucerno, deteljo, travo za pridelavo semena in pašnike je zagotovljena s časom uporabe	<b>1,5-2 l/ha</b>  Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha.	- lucerno in deteljo tretiramo po tretjem razvitem listu posevka, - semenske trave tretiramo v času, ko ima trava 3 – 5 listov, - pašnike tretiramo, ko ima trava 3 – 5 listov in detelje pa več kot 3 liste.	S sredstvom na istem zemljišču tretiramo največ 1-krat letno pri temperaturah od 10 do 25°C. Po tretiranju naj vsaj nekaj ur ne dežuje.  <b><u>Sredstvo je selektivno na metuljnice-detelje.</u></b>
<b>DUPLOSAN KV</b> mekoprop – P 60 %  <b>Karenca:</b> travniki in pašniki 28 dni	<b>3,0 l/ha</b>	- tretiramo v času, ko so rastline visoke 20-30 cm	Deloma škodljivo deluje na detelje. Manj zadovoljivo deluje na alpsko kislino ( <i>Rumex alpinus</i> ). Priporočilo: uporaba v zmerno toplem vremenu (temperature med 10 in 25°C). <b><u>Sredstvo se lahko uporablja le ob uporabi traktorske škropilnice!</u></b> Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.
<b>ESTERON</b> 2,4-D 2-EHE 90,5% <b>Karenca:</b> za travnike in pašnike je 28 dni	<b>1 l/ha</b>  Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha	- na pašnikih in travnikih spomladi v fenološki fazi od razvrščanja do stopnje zastavičarja (BBCH 21-39)	Za zatiranje <b>ENOLETNEGA ŠIROKOLISTNEGA PLEVELA.</b>  Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.

Preparat aktivna snov	odmerek	uporaba	opombe
<b>GRODYL</b> amidosulfuron 75%  <b>Karenca:</b> 7 dni za travo za pašo in svežo krmo, 21 dni za seno	<b>1,0 g/10 l vode</b>  <b>40-60 g/ha</b>  Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha.	- posamezne rastline oz. gnezda nekaterega širokolistnega plevela;  - po prvem ali tretjem odkosu (rastline visoke približno 10-15 cm),	<b>Prednost pred tretiranjem celotne površine ima tretiranje posameznih rastlin!</b> Za zatiranje: topolistne in kodrolistne kislice, navadnega regrata, zlatih, travniške penuše, navadnega rmana, koprive, navadne lakote in navadnega dežena. <b><u>Sredstvo je selektivno za plazečo deteljo in delno za lucerno.</u></b>
<b>HARMONY 75 WG</b> tifensulfuron - metil 75%  <b>Karenca:</b> travniki in pašniki 21 dni	<b>20-30 g/ha + močilo</b>  <b>0,6 g/10 l vode + močilo</b>	- tretiramo rastline v fazi bujne rasti v stadiju rozete (višina 15 cm oz- 4 liste)  - tretiramo lahko tudi posamične rastline oz. gnezda nekaterih vrst širokolistnega plevela (preko celega leta).	<b><u>Cele površine tretiramo jeseni ali pozno poleti.</u></b>  <b><u>Sredstvo je selektivno na metuljnice-detelje.</u></b>  Ne uporabljati pri T višjih od 25°C in nižjih 6°C!  Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.
<b>HERBOCID</b> 2,4-D DMA 55,9 %  <b>Karenca:</b> travniki in pašniki 28 dni	<b>2,2 l/ha</b>  Priporočena poraba vode do 400 l/ha.	- tretiramo v času, ko so trave v polnem razraščanju oz. po prvem odkosu, ko se začnejo ponovno razraščati.	Tretiramo pri temperaturah med 5 in 25°C!  Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.
<b>STARANE 2</b> ali <b>TOMIGAN 200 EC</b> fluroksipir 1 MHE 28,8 %  <b>Karenca:</b> travniki in za dostop rejnih živali na pašnike 21 dni	<b>1,2-1,8 l/ha</b>  Priporočena poraba vode: 300-400 l/ha	- tretiramo v času intenzivne rasti plevelov.	Za zatiranje kislic, navadnega regrata, velike koprive in drugih širokolistnih plevelov.  Sredstva se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu ter na kraških območjih in tleh z vsebnostjo organske snovi pod 2%. Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.

Pripravek aktivna snov	odmerek	uporaba	opombe
<b>TANDUS 200 EC</b> fluroksipir 1 MHE 20 %  Karenca: travniki in za dostop rejnih živali na pašnike 21 dni	<b>0,75 l/ha</b> Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha  <b>2 l/ha</b> Priporočena poraba vode: 300-400 l/ha	-za zatiranje navadne zvezdice, - veliko koprivo in navadni regrat se tretira med aktivno rastjo pred cvetenjem, -kodrolistno in topolistno kislico se tretira spomladi (visoka 15 do 20 cm), - robide se tretira v času aktivne rasti (med junijem in avgustom)	Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.
<b>U 46 M-FLUID</b> MCPA DMA 94,3%  Karenca: travniki 28 dni, pašniki (dostop živine na pašo) 28 dni	<b>1,5-2,0 l/ha</b> Priporočena poraba vode: 200-600 l/ha.	- travniki in pašniki, pridelava travnega semena (spomladi ali jeseni)	Priporoča se tretiranje pri temperaturah zraka pod 25°C, v razmerah brez vetra, v večernih urah.  Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.

Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva **OBVEZNO** preberite in **UPOŠTEVAJTE** navedbe na **ETIKETI** in **NAVODILO O UPORABI**, ki je priloženo sredstvu!

## **NESELEKTIVNI HERBICIDI za ZATIRANJE ŠČAVJA in NEŽELENIH ZELI NA TRAVNIKIH in PAŠNIKIH**

Pripravek aktivna snov	odmerek	uporaba
<b>DOMINATOR ULTRA 360 SL</b> glifosat v obliki izopropilamino soli 48,6 %  Karenca: travniki in pašniki zagotovljena z načinom uporabe.	<b>2,5-4 l/ha</b> (enoletni plevel)  <b>5-7 l/ha</b> (večletni plevel)	Za tretiranje posameznih plevelnih gnezd (ščavje, kopriva, čmerika) ali celih površin.  Tretiramo med intenzivno rastjo plevela in travne ruše.  Na tretiranem zemljišču se lahko ponovno pase in kosi najmanj 7 dni po tretiranju.  Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 1-krat v 1 rastni sezoni.
<b>ROUNDUP ULTRA ali ROUNDUP</b> glifosat v obliki izopropilamino soli 48 %  Karenca: travniki in pašniki: zagotovljena z načinom uporabe.	<b>2-3 l/ha</b> (enoletni plevel)  <b>4 l/ha</b> (večletni plevel)	Za obnovo travnikov in pašnikov se tretira v času intenzivne rasti.  Na tretiranih zemljiščih je prepovedana paša živine za prirejo mleka, kakor tudi krmljenje s senom s tretiranih površin. Ostala živina se lahko pase in krmi s tretiranim senom 7 dni po tretiranju.  Ne uporabljati v vročem oziroma vetrovnem vremenu.  Isto zemljišče lahko s sredstvom tretiramo največ 2-krat v 1 rastni sezoni.
<b>ROUNDUP ENERGY</b> glifosat v obliki kalijeve soli 55,1 %  Karenca: travniki in pašniki zagotovljena z načinom uporabe.	<b>1,6 – 2,4 l/ha</b> (enoletni plevel)  <b>3,2 l/ha</b> (večletni plevel)	Za obnovo travnikov in pašnikov se tretira v času intenzivne rasti.  Ne uporabljati v vročem oziroma vetrovnem vremenu.  Na tretiranih zemljiščih je prepovedana paša živine za prirejo mleka, kakor tudi krmljenje s senom s tretiranih površin. Ostala živina se lahko pase in krmi s tretiranim senom 7 dni po tretiranju.  Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporablja največ 2-krat v eni rastni sezoni.

Travno deteljna mešanica (TDM) se lahko ponovno poseje 14 dni po tretiranju!