

## VARSTVO KROMPIRJA PRED PLEVELI

Krompir ima srednje dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom. Tekmovalna sposobnost je odvisna predvsem od termina sajenja, gostote sestoja in zdravstvenega stanja rastlin. V začetku razvoja lahko krompirju uspešno pomagamo z mehanskimi ukrepi. S pleveli je manj težav pri pridelavi zgodnjih sort krompirja.




V naših krompiriških prevladujejo ščiri, metlike, rogovilček, dresni, plezajoča lakota, različne kamilice, vijolice, zebrati, osati in slak, od ozkolistnih pa pirnica, kostreba, srakonja, divji sirek, muhviči in srakoperec. Pogosti so manj in srednje tekmovalni pleveli, kot so mrtva kopriva, plešec, zvezdica, jetičniki,... Največ težav imamo pri zatiranju plezajoče lakote, slaka, gabeza, kislic, preslic in njivske škrbinke.

Glede na tehniko pridelovanja krompirja je mehansko zatiranje plevelov skoraj enakovredno kemičnemu zatiranju. Želimo si, da bi zatiranje plevelov temeljilo na večkratnem mehanskem zatiranju, vendar moramo pri pridelavi semenskega krompirja upoštevati možnost mehanskega prenosa virusov in zato mehansko zatiranje izvajamo le zgodaj v razvoju in na način, da ne prihaja do stikov med delovnimi elementi orodij in organi krompirja. Ob sajenju tako globino sajenja in obliko grebenov prilagodimo načinu mehanskega zatiranja (da čim bolj prizadenemo plevel in čim manj krompir). Pri izvajanju mehanskega zatiranja moramo biti pozorni na primerno vlažnost – suhost tal, da ne uničujemo strukture in da se poškodovani pleveli ne vrastejo ponovno. Možnosti za uporabo mehanskih metod so vezane na tip tal in na razpoložljiva orodja. Pri lažjih peščenih tleh lahko izvajamo pogosto in enostavno mehansko zatiranje. V primeru kombiniranja mehanskih metod zatiranja z uporabo herbicidov v krompirju, pa moramo dobro poznati lastnosti uporabljenih herbicidov.

## Primer MEHANSKEGA ZATIRANJA PLEVELA V KROMPIRJU

Pri krompirju in vseh okopavinah je pred sajenjem ali setvijo priporočljiva slepa setev.

### Opravila na njivi s krompirjem:




**1. Česanje, brananje malo pred VZNIKOM**  
(plevel v fazi kaljenja)



**2. Plitvo okopavanje približno 14 dni po česanju**



**3. Globoko okopavanje in osipavanje**



**4. Česanje oz. brananje, krompir do 10 cm**



**5. Medvrstno okopavanje**



**6. Osipavanje pred sklenitvijo vrst**

Število herbicidov je omejeno in za nekatere, predvsem trajne plevela (npr. njivski slak), nimamo ustreznih kemičnih rešitev. Trajne plevela moramo tako zatreti v drugih poljščinah ali na strniščih.

### V Sloveniji so za uporabo v krompirju registrirani naslednji herbicidi (13. april 2022):

| Sredstvo<br>aktivna snov  | odmerek  | čas uporabe, opombe<br><b>KARENCA</b>  |
|---|--|--|
| <b>PREDSETVENA OBDELAVA TAL ali PO SETVI, V ČASU DO 5 DNI PO SETVI</b>  |  |  |
| <b>CREDIT XTREME</b><br>glifosat v obliki izopropil<br>amino soli 40,08 % +<br>glifosat v obliki kalijeve<br>soli 29,77 % | 1,33 – 4,0 l/ha<br><br>(priporočena poraba<br>vode: 100-400 l na ha) | - Za zatiranje vzniklega <b>eno-, dvo- in večletnega plevela</b> , v času pred setvijo/saditvijo krompirja.<br>- Uporabimo ga v <b>predsetveni obdelavi tal</b> .<br><b>KARENCA: zagotovljena s časom oziroma načinom uporabe</b>  |
|   | 1,2 – 2,0 l/ha<br><br>(priporočena poraba<br>vode: 100-400 l na ha)  | - Za zatiranje vzniklega <b>eno-, dvo- in večletnega plevela</b> , po setvi, v času do 5 dni po setvi, vendar pred vznikom posevka.<br><br><b>KARENCA: zagotovljena s časom oziroma načinom uporabe</b>  |
| <b>ROUNDUP<br/>POWERMAX</b><br>glifosat (v obliki<br>amonijeve soli) 79,2 %<br><br>Zaloge v uporabi do<br>17.11.2022      | 1,0 kg/ha<br><br>(priporočena poraba<br>vode: 150-200 l na ha)       | - Za zatiranje <b>enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela</b> 7 do 10 dni pred setvijo.<br>- Sredstvo se mora uporabljati pri temperaturah zraka do 25 °C.<br>- Zemljo je mogoče obdelovati 7-10 dni po tretiranju s sredstvom.<br><b>KARENCA: zagotovljena s časom oziroma načinom uporabe</b> |

| Sredstvo aktivna snov  | odmerek  | čas uporabe, opombe<br>KARENCA  |
|--|--|---|
| <b>TRETIRAMO PO SAJENJU in PRED VZNIKOM KROMPIRJA</b>              |  |   |
| <b>ENOLETNI ŠIROKOLISTNI PLEVEL</b>                                |  |   |
| <b>ANGELUS</b><br>klomazon 36 %                                    | 0,25 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo takoj po setvi in pred vznikom posevka, v razvojni fazi začetka tvorbe stebela (BBCH 00-07).</li> <li>- Zatira navadni plešec in navadno zvezdico, zmanjšuje številčnost populacije plezajoče lakote, omejeno deluje zoper belo metliko, navadno rosnico, škrlatnordečo mrtvo koprivo in navadni slakovce.</li> </ul> <p><b>KARENCA je zagotovljena s časom uporabe</b></p>  |
| <b>CLOMATE</b><br>klomazon 36 %                                    | 0,25 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo pred vznikom posevka, vendar najpozneje 7 dni po sajenju.</li> <li>- Sredstvo zatira: belo lobodo, plezajočo lakoto, škrlatnordečo mrtvo koprivo in navadno zvezdico.</li> <li>- <b>KARENCA je zagotovljena s časom uporabe</b></li> </ul>   |
| <b>ENOLETNI OZKOLISTNI IN ŠIROKOLISTNI PLEVELI</b>                 |  |   |
| <b>BOXER</b><br>prosulfokarb 80 %                                  | 5,0 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo po sajenju, tik pred vznikom na dobro oblikovanih grebenih. Tal ne obdelujemo, dokler krompir ne vznikne in plevel propade.</li> <li>- Dobro zatira enoletno latovko, ščir, pasje zelišče, navadno zvezdico, njivsko spominčico, pravo kamilico, enoletni golšec, krvomočnico, škrlatnordečo mrtvo koprivo in jetičnike.</li> <li>- Delno zatira: navadni srakoperec, belo metliko, plezajočo lakoto, dresni in njivsko vijolico.</li> </ul> <p><b>KARENCA je zagotovljena s časom uporabe</b><br/><b>S sredstvom se lahko tretira le z napravami na traktorski pogon.</b></p>   |
| <b>CHALLENGE</b><br>aklonifen 60 %                                 | 4 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 100-300 l na ha)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo po sajenju in pred vznikom.</li> <li>- Zatira: njivni lisičji rep, belo metliko, dvoredec, žabje ločje, jajčastolistno lazico, kamilice, enoletni golšec, njivno gorjušico, hrapavo škrbinko, njivski jetičnik.</li> <li>- Zmanjšuje številčnost populacije: navadnega ščira, njivske zavratnice, kopjastolistne lazice, ptičje dresni, navadnega slakovca, breskove dresni in vijolice.</li> </ul> <p><b>KARENCA: 90 dni</b></p>  |
| <b>CHANON</b><br>aklonifen 60 %                                    | 3 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 150-500 l na ha)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo po sajenju in pred vznikom.</li> <li>- Zatira: baržunasti oslez, belo metliko, srhkodlakavi ščir in navadni slakovec, navadno kostrebo</li> <li>- Omejeno deluje na njivski slak in pasje zelišče.</li> </ul> <p><b>KARENCA je zagotovljena s časom uporabe</b></p>  |
| <b>METRIC</b><br>klomazon 6 % +<br>metribuzin 23,3 %               | 1 – 1,5 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo pred vznikom plevela (približno 7 dni pred vznikom krompirja).</li> <li>- Odmerek 1,5 l/ha se uporabi za zatiranje srakonje in pasjega zelišča. Za zatiranje navadnega plešca, bele metlike, plezajoče lakote, mrtve koprive, navadnega slakovca, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice, navadne kostrebe in muhviča pa v odmerku 1 l/ha.</li> <li>- Sredstva se ne sme uporabljati na zelo lahkih in peščenih tleh. Ne sme se ga uporabljati v tleh, kjer je več kot 10 % organske snovi.</li> </ul> <p><b>KARENCA je zagotovljena s časom uporabe</b><br/><b>Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice.</b></p>  |
| <b>PLATEEN WG 41,5</b><br>metribuzin 17,5 % +<br>flufenacet 24 %   | 2 - 2,5 kg/ha  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo po sajenju, vendar pred vznikom krompirja (grebeni se sesedejo).</li> <li>- Uporablja se kot talni in foliarni (listni) herbicid po vzniku plevela.</li> <li>- <b>MOŽNOST FITOTOKSIČNOSTI:</b> v primeru zelo neugodnih vremenskih razmer z nizkimi temperaturami ali veliko padavinami, ko so tla močno razmočena in ob nepravočasni uporabi sredstva.</li> </ul> <p><b>KARENCA je zagotovljena s časom uporabe</b><br/><b>Uporaba sredstva je dovoljena samo ob uporabi traktorske škropilnice.</b></p>  |
| <b>SHARPEN 33 EC</b><br>pendimetalin 33 %                          | 3-5 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo pred vznikom krompirja, po oblikovanju grebenov.</li> <li>- Nižji odmerek uporabimo pri manjši zastopanosti plevelov, višjega pa pri večji zastopanosti plevelov na površini.</li> <li>- Sredstvo zatira naslednje plevela: lisičji rep, srakoperec, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo, laško ljulko, enoletno latovko in sivozelene muhvič, ščir, samosevno ogrščico, navadni plešec, belo metliko, osat, navadni kristavec, čepljevec, lakoto, navadno posončnico, škrlatnordečo mrtvo koprivo, kamilico, enoletni golšec, njivsko spominčico, poljski mak, dresen, tolščak, navadno zvezdico, redkev, pasje zelišče, njivski mošnjak, jetičnik in njivsko vijolico.</li> </ul> <p><b>KARENCA: zagotovljena s časom uporabe</b></p> |
| <b>SHARPEN PLUS (staro ime SHARPEN 40 SC)</b><br>pendimetalin 40 % | 2,5-4 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha)   | <p><b>KARENCA: zagotovljena s časom uporabe</b></p>   |

| Sredstvo aktivna snov   | odmerek  | čas uporabe, opombe<br>KARENCA  |
|---|--|---|
| <b>ENOLETNI ŠIROKOLISTNI IN NEKATERE VRSTE OZKOLISTNEGA PLEVELA</b>   |  |   |
| <b>STOMP AQUA</b><br>pendimetalin 45,5 %                              | 2,9 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 100-200 l na ha)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sredstvo učinkovito zatira: enoletno latovko, navadno zvezdico, navadno lobodo, poljski mak, belo metliko, njivsko spominčico, njivsko vijolico, ptičjo dresen, škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivno kurjo češnjico, jetičnik, pasje zelišče, samoniklo oljno ogrščico.</li> <li>- Po tretiranju s sredstvom se tretiranih tal ne sme obdelovati 3 do 5 tednov. Sredstva se ne sme zadelati (inkorporirati) v tla.</li> <li>- Sredstva ni dovoljeno uporabljati na tleh z deležem organske snovi nad 6 % ter zelo lahkih tleh, v času suše, v času pred napovedanimi obilnejšimi padavinami, v posevkih v stresu (škodljivci, bolezn, zdrževanje voide v tleh, slabo pripravljena tla).</li> </ul> <p><b>KARENCA: zagotovljena s časom uporabe</b></p>  |
| <b>BUZZIN</b><br>metribuzin 70 %                                      | 0,75 kg/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sredstva se ne sme uporabiti v posevkih namenjenih pridelavi semenskega krompirja.</b></li> <li>- Posebej dobro zatira srakonje, navadno kostrebo, enoletno latovko, škrlatnordečo mrtvo koprivo, ogrščico, belo metliko, nedišečo trirobko, enoletni golšec, breskovo dresen, njivski mošnjak, navadni grint, navadno zvezdico, perzijski jetičnik in njivsko vijolico. Zmanjšuje zapleveljenost z navadnim zebratom in laško ljulko. Omejeno deluje tudi na navadni ščir, navadno rosnico, plezajočo lakoto, navadni slakovec in pasje zelišče.</li> </ul> <p><b>KARENCA: zagotovljena s časom uporabe</b></p>  |
| <b>PROMAN</b><br>metobromuron 50 %                                    | 3,0 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo pred vznikom krompirja.</li> <li>- Sredstvo zatira enoletne širokolistne plevela, kot so: navadni plešec, škrlatnordeča mrtva kopriva, nedišeča trirobka, navadna zvezdica, perzijski jetičnik, njivska vijolica, bela metlika, breskova dresen in pasje zelišče, ter enoletne ozkolistne plevela, kot so: enoletna latovka, zeleni muhvič in gluhi oves.</li> <li>- Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z enoletnim širokolistnim plevelom, kot je: srhkodlakavi ščir.</li> </ul> <p><b>S sredstvom se lahko tretira samo pozne in srednje pozne sorte krompirja, uporaba v zgodnjih sortah krompirja, ki ima vegetacijo krajšo od 115 dni, pa ni dovoljena.</b></p> <p><b>Tretiranega krompirja se ne sme uporabljati za krmo za živali.</b></p> <p><b>KARENCA: zagotovljena s časom uporabe</b></p>   |
| <b>SINOPIA</b><br>klomazon 2,4 % + metobromuron 40 %                  | 3,0 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 150-400 l na ha)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo takoj po sajenju gomoljev (do 5 dni po sajenju), pred vznikom krompirja.</li> <li>- Zatira belo metliko, nedišečo trirobko, navadni plešec, srhkodlakavi ščir, plezajočo lakoto, breskovo dresen in njivsko vijolico ter omejuje številčnost populacije navadne kostrebe.</li> </ul> <p><b>KARENCA: zagotovljena s časom uporabe</b></p>   |
| <b>ENOLETNI OZKOLISTNI IN ŠIROKOLISTNI PLEVEL TER PLAZEČA PIRNICA</b> |  |   |
| <b>STALLION SYNC TEC</b><br>klomazon 3 % + pendimetalin 33,3 %        | 3,0 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sredstva se ne sme uporabljati v semenskem krompirju.</b></li> <li>- S sredstvom tretiramo čim prej po opravljenem sajenju vendar pred vznikom krompirja in plevelov. Tretiramo preden se na zemlji pojavijo razpoke. Rahlo strukturirane brazde je potrebno pustiti nekaj časa pri miru, da se sesedejo, preden se začne s tretiranjem. Tretirati se sme najpozneje 7 dni pred vznikom.</li> <li>- Sredstvo dobro deluje na plazečo pirnico, navadno kostrebo, navadni plešec, belo metliko, navdano rosnico, enoletni golšec, njivsko spominčico, ptičjo dresen, navadni slakovec, pasje zelišče, njivski mošnjak in malo koprivo. Srednje dobro deluje na enoletno latovko, srhkodlakavi ščir, oljno ogrščico, plezajočo lakoto, koprivo, kamilico, breskovo dresen, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, jetičnik in njivsko vijolico.</li> </ul> <p><b>KARENCA: zagotovljena s časom uporabe</b></p> |

| Sredstvo aktivna snov  | odmerek   | čas uporabe, opombe<br>KARENCA  |
|--|---|---|
| <b>TRETIRAMO PRED VZNIKOM KROMPIRJA ali KMALU PO VZNIKU KROMPIRJA</b>            |   |   |
| <b>ENOLETNI ŠIROKOLISTNI IN NEKATERE VRSTE OZKOLISTNEGA PLEVELA</b>              |   |   |
| <b>SENCOR SC 600</b><br>metribuzin 60 %  | 0,75 l/ha<br><br>oziroma<br>0,15 l/ha   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo <u>po sajenju pred vznikom krompirja</u> (na istem zemljišču je dovoljeno eno tretiranje v rastni dobi)</li> <li>- Tretiramo <u>po vzniku krompirja</u> (plevel v fazi kličnih listov do 2 pravih listov). V primeru naknadnega vznika plevela se tretiranje ponovi z enakim odmerkom. Interval med tretiranjii naj znaša od 10 do 14 dni, pri čemer se drugo tretiranje opravi najpozneje do stadija, ko ima rastlina na glavnem stebelu razvitih devet listov (do BBCH 19).</li> <li>- Še posebej učinkovito zatira: metlike, njivski slak, rogovilčke, dresni in navadni grint.</li> </ul> <p>POZOR: Sredstvo se NE sme uporabljati pri sortah Jaerla, SV 77/40 in 76/48, Dobrin, Eva, Jetta, Voran in Wineta (novejše sorte – posvetujte se z zastopnikom ali proizvajalcem).</p> <p><b>KARENCA: 42 dni</b><br/><b>Uporaba sredstva je dovoljena samo ob uporabi traktorske škropilnice.</b></p> |
| <b>TRETIRAMO PO VZNIKU KROMPIRJA in PLEVELOV</b>                                 |   |   |
| <b>ENOLETNI ŠIROKOLISTNI IN NEKATERE VRSTE VEČLETNEGA ŠIROKOLISTNEGA PLEVELA</b> |   |   |
| <b>BASAGRAN 480</b><br>bentazon 48 %   | 1,5 – 2,0 l/ha<br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo ko je krompir visok največ 10 cm, in temperatura zraka ne presega 25 °C.</li> <li>- Dobro zatira njivsko pasjo kamilico, navadni plešec, ščavjelistno dresen, metlike, pasje zelišče, njivsko redkev, njivski mošnjak, kamilice, belo gorjušico. Učinkovito deluje na plevela v zgodnejših razvojnih fazah. Za dobro delovanje sredstva morajo biti listi in stebela dobro omočeni.</li> <li>- POZOR: tretiranje v sončnem in vročem vremenu ter pri tretiranju občutljivih sort krompirja obstaja možnost poškodb (prehodna razbarvanja ali manjši ožigi).</li> </ul> <p><b>KARENCA: 42 dni</b></p>   |
| <b>OZKOLISTNI IN ŠIROKOLISTNI PLEVELI</b>  |   |   |
| <b>RIM 25 WG</b><br>rimsulfuron 25 %   | 60 g/ha + dodatek<br><b>MOČILA!</b><br><br>(poraba vode: 200-300 l na ha)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo po vzniku posevka, ko krompir od enega do sedem listov (BBCH 11-17).</li> <li>- Optimalni čas za tretiranje s sredstvom je po vzniku plevela, ko ima ozkolistni plevel od tri do pet listov in širokolistni plevel od dva do štiri liste.</li> <li>- Za zatiranje npr. srhodlakavega ščira, navadnega plešca, sončnice, nedišeča trirobke, prave kamilice, vonjave kamilice, navadnega slakovca, breskove dresni, njivske gorjušice, navadne zvezdice, njivskega mošnjaka, njivske vijolice, plazeče pirnice, navadne kostrebe, enoletne latovke in divjega sirka.</li> <li>- Za zmanjševanje zapleveljenosti z npr. navadno ambrozijo, belo metliko, ptičjo dresnijo, krvavordečo srakonjo in sivozelenim muhvičem.</li> </ul> <p><b>KARENCA zagotovljena s časom uporabe</b></p>   |
| <b>RIMURON 25 WG</b><br>rimsulfuron 25 %   | 50 g/ha + dodatek<br><b>MOČILA!</b><br><br>(priporočena poraba vode: 200-400 l na ha) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo, ko ima krompir vsaj 9 listov oz. je višji od 4 cm, do faze začetka rasti glavnih stebel, ko je nižji od 20 cm (BBCH 109-300)</li> <li>- Temperatura zraka naj bo 10-25°C</li> <li>- za zatiranje: navadne kostrebe, navadne zvezdice, enoletne latovke, navadnega plešca, njivskega mošnjaka, navadne rosnice, nedišeče trirobke, plazeče pirnice in samosevne oljne ogrščice;</li> <li>- za zmanjševanje zapleveljenosti z: navadnim ščiro, belo metliko, pasjim zeliščem, breskovo dresnijo, pravo kamilico, enoletnim golšcem in drobnocvetnim rogovilčkom</li> </ul> <p><b>KARENCA zagotovljena s časom uporabe</b></p>   |
| <b>RINCON 25 SG</b><br>rimsulfuron 25 %  | 60 g/ha + dodatek<br><b>MOČILA!</b><br><br>(poraba vode: 200-400 l na ha)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tretiramo po vzniku plevela in krompirja, od razvojne faze, ko se prvi listi začenjajo razgrinjati, do faze, ko se začenjajo vrste sklepati (BBCH 10-30).</li> <li>- Sredstvo na enoletne plevela najbolje deluje v fazi 2-3 listov, na plazečo pirnico pa v fazi 5-7 listov (višina 15-25 cm).</li> <li>- Dobro zatira: modri glavinec, navadno zvezdico, nedišečo trirobko, plezajočo lakoto, navadni plešec, njivski mošnjak, navadno kostrebo in plazečo pirnico.</li> <li>- Srednje dobro zatira: njivsko vijolico, drobnocvetni rogovilček in belo metliko.</li> </ul> <p><b>KARENCA zagotovljena s časom uporabe</b></p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>TAROT 25 WG</b><br>rimsulfuron 25 %  | 40 - 50 g/ha +<br>obvežen dodatek<br><b>MOČILA !</b>             | - Tretiramo, ko ima plevel 2-3 liste, krompir pa je v fazi od 3 listov do najpozneje začetka sklepanja vrst.<br><b>KARENCA zagotovljena s časom uporabe</b><br>Sorte krompirja za katere sredstvo NI FITOTOKSIČNO: Batik, Cilena, Linda, Quarta, Selma, Arfa, Laura, Primura, Concurrent, Jearla, Desiree, Heme in Roda.<br>Pred uporabo v ostalih sortah krompirja se glede fitotoksičnosti posvetujte z zastopnikom! |
| <b>ENOLETNI IN VEČLETNI OZKOLISTNI PLEVELI</b>  |  |  |
| <b>AGIL 100 EC</b> ali<br><b>ZETROLA</b><br>propakvizafop 10 %  | 0,75-1,0 l/ha  | - Za zatiranje enoletnih ozkolistnih plevelov (od stadija dveh listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov))  |
|   | 1,0-1,5 l/ha   | - Za zatiranje plazeče pirnice (v razvojni fazi od drugega do četrtega lista); njivnega lisičjega repa, navadnega srakoperca, gluhega ovsa in angleške ljulke (od razvojne faze od dveh listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov)).  |
| <b>KARENCA: 30 dni</b><br><b>S sredstvom se ne sme tretirati zgodnjih sort krompirja!</b><br>Razmak med tretiranj s tem sredstvom in s herbicidi za zatiranje širokolistnega plevela mora biti najmanj 3 dni.   |  |  |
| <b>FOCUS ULTRA</b><br>cikloksidim 10 %  | 2 l/ha ALI<br>1 l/ha z dodatkom 1<br>l/ha močila DASH HC         | Za zatiranje:<br>- enoletnega ozkolistnega plevela ter samosevni žit (v razvojni fazi od dveh pravih listov, do konca razraščanja).  |
|   | 4 l/ha ALI<br>2 l/ha z dodatkom 2<br>l/ha močila DASH HC         | - večletnega ozkolistnega plevela (v razvojni fazi od prvih treh do petih pravih listov oziroma so veliki do 15 cm).   |
| Tretiramo, ko je gojena rastlina v fazi od dveh do devet pravih listov (BBCH 12-19).<br>Priporočena količina vode je 100-400 l/ha. <b>V primeru uporabe ročne nahrbtnne škropilnice pri tretiranju nizkih gojenih rastlin mora biti odmerek vode vsaj 300 l/ha.</b><br><b>KARENCA: 56 dni</b>   |  |  |
| <b>FUSILADE FORTE</b><br>fluazifop-p-butil 15 %   | 0,8 – 1,3 l/ha<br>(priporočena količina<br>vode je 100-400 l/ha) | - Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljuvk v razmerah od majhne do srednje stopnje zapleveljenosti (v času, ko imajo pleveli razvita najmanj dva lista, vendar ne po koncu razraščanja).<br>Tretira se v razvojni fazi pred cvetenjem.<br><b>KARENCA: 90 dni</b>  |
| <b>FUSILADE MAX</b><br>fluazifop-p-butil 12,5 %   | 1,6 l/ha<br><br>(priporočena količina<br>vode je 100-400 l/ha)   | - Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljuvk (v času, ko imajo pleveli razvita najmanj dva lista, vendar ne po koncu razraščanja; v razmerah majhne do srednje stopnje zapleveljenosti).<br>- Tretiramo v razvojni fazi pred cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste sklenejo.<br><b>KARENCA: 90 dni</b>   |
| <b>SELECT SUPER</b><br>kletodim 12 %  | 1,0 – 2,5 l/ha   | - Za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela (od razvitega vsaj 3 listov in najpozneje do konca razraščanja plevela), enoletne latovke (d konca razraščanja naprej) in plazeče pirnice (visoka od 15 do največ 35 cm).<br>- Tretiramo, ko je krompir od razvojne faze razvitega prvega para listov do faze, ko se 30% rastlin stika med vrstami.<br><b>KARENCA: 56 dni</b>                                 |
| <b>TARGA SUPER</b><br>kvizalofop – p- etil 5 %  | 1,2 l/ha   | - Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela (optimalen čas za zatiranje je od faze drugega lista do konca razraščanja plevela).   |
|   | 2,0 l/ha   | - Za zatiranje plazeče pirnice (optimalen čas za zatiranje je od stadija četrtega do šestega lista plevela).   |
| Poraba vode: 200-400 l na ha)<br>- Sredstvo učinkovito zatira naslednje enoletne ozkolistne plevela: njivski lisičji rep, navadno kostrebo, ljulke, muhviče, navadno proso, stoklase, navadni srakoperec, samosevna žita in plazečo pirnico.<br>Tretiramo, od razvojne faze, ko ima krompir razvita dva lista, do začetka cvetenja (BBCH 12 do 61).<br><b>Uporaba sredstva ob uporabi ročne nahrbtnne škropilnice ni dovoljena.</b><br><b>KARENCA: 45 dni</b> |  |  |

Opomba: z rumeno barvo so obarvani herbicidi, ki vsebujejo a.s., ki jih je prepovedano uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) ter pri vključitvi v KOPOP, operacija VOD (zahteva VOD\_FFSV) in/ali operacija POZ (zahteva POZ\_FFSV) NI DOVOLJENA.

**PRED UPORABO FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA OBVEZNO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE NAVEDBE na ETIKETI oz. NAVODILU O UPORABI (varstveni pasovi ob vodotokih,...)!**

**Pred uporabo herbicida preverite tudi morebitne omejitve pred setvijo naslednjega posevka (omejitve v kolobarju)!**

Pripravila: Vesna Kunst, mag. inž. hort.  
svetovalka specialistka II (za varstvo rastlin)