


ZATIRANJE PLEVELOV V POSEVKIH OLJNIH BUČ

Buče imajo dokaj slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom tako v začetku razvoja, kot tudi v drugem delu rastne dobe. So šibek člen kolobarja in lahko pomembno vplivajo na povečanje zapleveljenosti njiv, posebej če dolgo čakamo s spravilom.



V prvi vrsti moramo poskrbeti, da buče sadimo na čisto njivo. To dosežemo z ustreznim kolobarjem in skrbjo za razpleveljenje v prejšnjih poljščinah. Ker buče sejemo razmeroma pozno, se lahko pred setvijo poslužujemo tehnike izčrpavanja zaloga plevelnih semen, tako, da zimsko brazdo na grobo poravnamo že v začetku aprila in s tem vzbudimo kalitev plevelov. Tri tedne kasneje opravimo prvo branje s katerim prizadenemo že vznikle plevela. Njivo pustimo pri miru še kakšnih 14 dni in nato izvedemo predsetveno pripravo.

Za zatiranje plevelov v posevkih oljnih buč imamo v Sloveniji trenutno registrirane tri herbicide, ki pa jih uporabimo bodisi pred setvijo s plitvo zadelavo v tla (herbicid na podlagi a.s. napropamid; v sušnih razmerah so rezultati zelo slabi) ali uporabo po setvi pred vznikom posevka (herbicida na podlagi a.s. klorazon in petoksamid; z njuno uporabo lahko pridelovalci bistveno izboljšajo uspeh zatiranja širokolistnih enoletnih plevelov). Tudi zato je večkratno mehanično zatiranje plevelov eden od ključnih ukrepov za uspešno pridelovanje buč. Mehansko zatiranje plevelov lahko izvajamo ročno ali strojno. Pri slednjem je potrebno že pri sistemu sajenja predvideti način vožnje pri kultiviranju (poznamo enovrstni in dvovrstni sistem, sistem šahovnica,...). Ne smemo zanemariti dejstva, da je pri zatiranju plevelov v bučah po 10 tednih razvoja strojno mehansko zatiranje plevela oteženo, ker so vreže zelo občutljive na poškodbe. Dodatno ročno zatiranje plevelov je pri pridelavi buč pogosto neizogibno, se pa večinoma izplača, saj tako podaljšamo rastno dobo in povečamo število oplojenih cvetov, ter posledično plodov.

Možnost varstva pred plevelom je tudi sajenje sadik buč na grebene pokrite s črno folijo ali sajenjem v zastirke iz sena, slame, žagovine in podobnih snovi. Takšni sistemi so primerni za posevke večjih vrednosti, za jedilne bučke in pri ekološki pridelavi.

Za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevelov lahko v posevkih oljnih buč uporabimo naslednje pripravke (na dan 03.05.2021; na istem zemljišču lahko našteje herbicide uporabimo največ enkrat v eni rastni sezoni!):

Herbicid aktivna snov (a.s.)	Odmerek Karenca	Opombe
PRED VZNIKOM PLEVELOV in BUČ		
CENTIUM 36 CS klomazon 36 % Karenca: zagotovljena s časom uporabe	0,25 l/ha Tretiramo v času po setvi, vendar pred vznikom posevka. Priporočena poraba vode: 200-300 l/ha	Talni herbicid namenjen zatiranju nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela v posevkih buč. Sredstva se ne uporablja na mokrem ali presuhem zemljišču, v času suše ali temperaturne inverzije. <u>Dobro zatira</u> plevela kot so: navadna zvezdica, perzijski jetičnik, enoletna latovka in plezajoča lakota. <u>Zadovoljivo zatira</u> belo metliko, poljski jetičnik, navadno kostrebo in škrlatno rdečo mrtvo koprivo. <u>Sredstvo ne zatira</u> navadne rosnice in njivske vijolice.
DEVIRINOL 45 FL napropamid 45 % Karenca: zagotovljena s časom uporabe	2 – 2,5 l/ha Tretira se pred setvijo s plitvo vdrlavo (inkorporacijo) na globino 2 do 5 cm. Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha	Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela . Sredstvo je potrebno inkorporirati najpozneje 30 minut po tretiranju. Uporaba ročne/oprtne škroplilnice ni dovoljena. MANJŠA UPORABA
FLEXIDOR (DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE) izoksaben 50 % Karenca: 114 dni	0,75 l/ha Tretira se po setvi in pred vznikom buč in plevelov, najpozneje 3 dni po setvi. Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha	Za zatiranje pelinolistne ambrozije, dresni, pasjega zelišča in ščirov v posevkih oljnih buč. Sredstvo smejo uporabljati samo poklicni pridelovalci oljnih buč, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine. Za sredstvo je izdano dovoljenje za nujne primere (promet je omejen – zainteresirani pridelovalci so morali do 2.4.2021 sredstvo naročiti, prodaja in uporaba sredstva pa nadzorovana). Dovoljenje je veljavno od 15.03. do 14.07.2021 (120 dni). Priporočilo za uporabo (glede na izkušnje pridelovalcev v Avstriji): uporaba kombinacije Flexidor 0,25 l/ha + Centium 36 CS 0,25 l/ha.
SUCCESSOR 600 petoksamid 60 % Karenca: zagotovljena s časom uporabe	2 l/ha Tretiramo v fenološki fazi pred vznikom buč. Priporočena poraba vode: 200-400 L/ha	Talni sistemski herbicid, ki se uporablja za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela . Sredstvo zatira ozkolistne plevela, kot so npr.: navadna kostreba, muhviči in enoletna latovka ter širokolistne plevela kot so npr.: srhodlakavi ščir, bela metlika, drobnocvetni rogovileček, kamilice, breskova dresen in pasje zelišče. Tretira se v času od setve do vznika buč tako, da so kaleče buče pokrite s prstjo. Običajno se tretira najpozneje v 3 do 5 dneh po setvi. <u>Sredstva se ne sme uporabljati na površinah s katerih je možno spiranje zaradi dežja ali namakanja.</u>
PO SETVI PRED VZNIKOM ali TAKOJ PO VZNIKU PLEVELOV IN BUČ		
CLOMATE klomazon 36 % Karenca: zagotovljena s časom uporabe	0,25 l/ha Tretiramo v času po setvi, pred vznikom, od razvojne faze suhega semena do faze, ko je drugi pravi list na glavnem stebelu v celoti razgrnjen (BBCH 00-12). Priporočena poraba vode: 200-300 l/ha	Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega širokolistnega plevela . MANJŠA UPORABA

Herbicid aktivna snov (a.s.)	Odmerek Karenca	Opombe
PO VZNIKU PLEVELOV in BUČ		
FUSILADE FORTE fluazifop-p-butil 15 % Karenca: zagotovljena s časom uporabe	0,8 l/ha (enoletni ozkolistni plevel) 1,3 l/ha (večletni ozkolistni plevel (divji sirek) s predhodno medvrstno obdelavo tal s katero razrežemo rizome) Priporočena poraba vode: 100-400 l/ha	Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela , razen enoletne latovke. Oljne buče tretiramo v času od razvojne faze, ko je drugi pravi list na glavnem stebelu v celoti razvit, do razvojne faze, ko je četrti pravi list na glavnem stebelu v celoti razvit (BBCH 12-14). MANJŠA UPORABA
FUSILADE MAX fluazifop-p-butil 12,5 % Karenca: zagotovljena s časom uporabe	1,0 l/ha (enoletni ozkolistni plevel) 1,5 l/ha (večletni ozkolistni plevel (divji sirek) s predhodno medvrstno obdelavo tal s katero razrežemo rizome) Priporočena poraba vode: 100-400 l/ha	

Opombe: z rumeno barvo so obarvani herbicidi, ki vsebujejo a.s., ki jih je PREPOVEDANO uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) ter pri vključitvi v KOPOP, operacija VOD (zahteva VOD_FFSV) in/ali operacija POZ (zahteva POZ_FFSV).

PRED UPORABO FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA OBVEZNO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE navedbe na ETIKETI in v NAVODILU O UPORABI!

Pripravila: mag. Iris Škerbot, svetovalec specialist II (za varstvo rastlin)